

Infeccion Urinaria



Las bacterias que normalmente residen en nuestro colon son los organismos más comunes que se encuentran en una infección del tracto urinario. Dado que las mujeres tienen uretras más cortas, tienden a ser más susceptibles a infecciones que comienzan en la vejiga. Si la infección tiene una posibilidad, puede extenderse hacia los riñones y causar mucho más dolor y potencialmente dañar los riñones. Algunas mujeres tienen paredes de la vejiga "más pegajosas" y contraen muchas más infecciones que el promedio. Algunos también tienen más dolor que otros, para ellos tenemos un medicamento colorido, fenazopiridina (Pyridium) que puede adormecer la vejiga directamente a través de la orina.

Si el cultivo que enviamos al laboratorio produce una bacteria típica y es sensible al medicamento que le recetamos hoy, debería sentirse mejor en unos días. Si tuviste orina rosada o roja con la infección y se aclara, ¡estaremos felices! A veces hay ardor al orinar y el cultivo no produce nada y eso podría ser una ETS como la clamidia o la gonorrea. Tenemos pruebas específicas para eso (¡y tratamiento!)

Si sigue teniendo síntomas que no mejoran, o si la sangre en la orina continúa, es posible que necesitemos examinar los riñones con una ecografía o una tomografía computarizada rápida del riñón y la vejiga. A veces, necesitamos un urólogo para realizar una cistoscopia en la que se coloca un tubo de fibra óptica en la vejiga (a través de la uretra). Por lo general, la sangre proviene solo de una infección, pero también podría significar un tumor en la vejiga o cálculos renales. Los síntomas típicos de las tres áreas que se infectan aquí son:

- Vejiga (cistitis) Uretra (uretritis)
 - Presión pélvica
 - Ardor al orinar
 - Molestia en la parte inferior del abdomen
 - Micción frecuente y dolorosa
 - Sangre en la orina

- Riñones (pielonefritis)
 - Dolor en la parte superior de la espalda y en el costado
 - Fiebre alta
 - Temblores y escalofríos
 - Náusea
 - Vómitos

Entonces para mejorar:

- Tome todos los medicamentos que le hayan recetado.
- No deje de tomarlos justo cuando empieza a sentirse mejor.
- Beba muchos líquidos, p. Ej. Jugo de arándano, Gatorade o agua.
- Haga un seguimiento si se le solicita para asegurarse de que la infección haya desaparecido por completo.

tsg con la ayuda de Giovanna 2-2022

Caring Family, S.C. 815 459-2200

Drs Gancayco (ambos), Ramirez, Giese y FNP Lauren. Visite nuestra línea web en: www.mycaringfamily.com