

Lombriz intestinal- pinworm

Ciclo de vida: Los huevos de oxiuros se inhalan o se ingieren a través de la boca o los dedos. Las larvas eclosionan en el duodeno y migran al intestino grueso donde maduran en 30-45 días. Se produce el



apareamiento y, por desgracia, el macho muere. La hembra, sin embargo, llega a vivir lo suficiente como para migrar al ano durante la noche y depositar unos 15.000 huevos en el área perianal. Secreta una sustancia muy irritante que provoca picazón. Su hijo se rasca el área y le quedan algunos huevos en los dedos o debajo de las uñas. Luego, los huevos se pueden transferir a la ropa, los juguetes y la bañera. Los huevos pueden sobrevivir de 2 a 3 semanas fuera del cuerpo humano. No importa qué tan buen padre sea usted, su hijo puede contraer lombrices intestinales (imás de una vez!).

¿Qué pasa si la infección por oxiuros se repite?

La persona infectada debe recibir el mismo tratamiento de dos dosis. Posiblemente sea necesario volver a tratar a los amigos o contactos del hogar.

¿Qué puedo hacer para mejorar y mantenerse libre de infecciones?

- Báñese al despertarse para lavar los huevos.
- Cámbiese y lávese la ropa interior todos los días.
- Cambie la ropa de dormir y las sábanas después del tratamiento.
- Debido a que los huevos son sensibles a la luz solar, abra las persianas o cortinas de los dormitorios durante el día.
- Lávese las manos después de ir al baño, después de manipular la ropa sucia, antes de comer y después de cambiar pañales.
- Córtese las uñas.
- Desaliente a morderse las uñas
- Evite rascarse las áreas anales desnudas.

tsg con la ayuda de Giovanna 2-2022

Caring Family, S.C. 815 459-2200

Drs Gancayco (ambos), Ramirez, Giese y FNP Lauren. Visite nuestra línea web en:

www.mycaringfamily.com